



Sargos y especies afines en Galicia

Rafael Bañón

Doctor en Biología, trabaja en el Instituto Español de Oceanografía de Vigo y es autor de numerosas publicaciones científicas y divulgativas sobre taxonomía y biología de peces, pesca artesanal, especies exóticas marinas y antropología pesquera.



Imagen 1. Sargos (*Diplodus sargus*) recién capturados por la flota gallega

1. Introducción

Conocemos como sargos y especies afines a los peces marinos que pertenecen a la familia Sparidae (espáridos). La familia cuenta actualmente con alrededor de 166 especies en todo el mundo, 24 de las cuales están presentes en la península Ibérica. En Galicia hay aproximadamente unas 19 especies, si bien algunas de ellas son citas muy antiguas que no han vuelto a aparecer y otras sin embargo son especies nuevas, que están llegando a nuestras costas por el cambio climático.

Las especies de espáridos mantienen semejanzas morfológicas que los hacen fácilmente identificables como pertenecientes a esta familia. Su cuerpo es ovalado, más o menos alto, y comprimido lateralmente. Tienen una sola aleta dorsal y otra anal y dientes especializados (incisivos, caninos o molares) según su dieta. Son especies costeras que habitan principalmente en latitudes templadas y tropicales, frecuentando fondos rocosos, arenosos o de fanerógamas marinas. Muchas especies son hermafroditas, pudiendo cambiar de sexo a lo largo de su vida.

Los espáridos son muy valorados por la calidad de su carne blanca y firme, lo que les otorga precios elevados en las lonjas. Son por ello objeto de pesca intensiva, tanto deportiva como comercial, así como de cultivo (acuicultura).

2. Como diferenciar las especies

Si bien las diferentes especies mantienen una forma y coloración de base similar, los podremos diferenciar por las manchas o bandas, las franjas del cuerpo y la forma de la boca.



Sargo/Sargo común *Diplodus sargus*



Sargo picudo/Sargo bicudo
Diplodus puntazzo



Sargo breado/Sargo acastañado
Diplodus cervinus



Mojarra/Chaparella
Diplodus vulgaris

Imagen 2. Especies del género *Diplodus*.

2.1. Género *Diplodus*

- Sargo/Sargo común (*Diplodus sargus*): Presenta una mancha negra característica en el pedúnculo caudal (nacimiento de la cola) que no llega al borde inferior, y suele tener entre 8 y 9 franjas verticales oscuras en el cuerpo que pueden difuminarse con la edad, siendo poco visibles.
- Sargo picudo/Sargo bicudo (*Diplodus puntazzo*): Se distingue por su hocico puntiagudo y alargado, con labios finos. Las franjas verticales son muy marcadas y alternan entre intensas y claras.
- Sargo breado o real/Sargo acastañado (*Diplodus cervinus*): Se reconoce fácilmente por sus 5 o 6 franjas transversales muy anchas y oscuras (casi marrones o negras) sobre un fondo plateado o dorado.

- Mojarra/Chaparella (*Diplodus vulgaris*): A menudo confundida con el sargo común, se diferencia por tener dos bandas negras muy marcadas, una detrás de la cabeza y otra en el pedúnculo caudal, y carecen de franjas verticales.



Besugo/Ollomol *Pagellus bogaraveo*



Aligote/Pancho bicudo *Pagellus acarne*



Breca *Pagellus erythrinus*

Imagen 3. Especies del género *Pagellus*.

2.2. Género *Pagellus*

- Besugo/Ollomol (*Pagellus bogaraveo*): Ojo grande, su diámetro es mayor que la longitud del rostro. Presenta una mancha negra al principio de la línea lateral, poco marcada en los ejemplares jóvenes.
- Aligote o besugo blanco/Pancho bicudo (*Pagellus acarne*): Es más alargado y pequeño que el besugo. Tiene una mancha oscura pequeña en la axila de la aleta pectoral.

- Breca (*Pagellus erythrinus*): Su cuerpo es más estilizado y su color es de un rosado más intenso, a menudo con pequeños puntos azulados brillantes. El borde superior del opérculo de color rojizo, con una mancha rojiza en la base de las aletas pectorales.



Dorada/Dourada *Sparus aurata*



Pargo/Prago *Pagrus pagrus*



Chopa/Choupa *Spondyliosima cantharus*

Imagen 4. Figuras de otras especies de espáridos presentes en Galicia.

2.3. Otros géneros y especies

- Dorada/Dourada (*Sparus aurata*): Una mancha oscura al comienzo de la línea lateral y una franja dorada curva entre los ojos, de donde proviene su nombre.
- Pargo/Prago (*Pagrus pagrus*): Dorso rojizo o rosado con la cabeza más oscura desde la nuca hasta la boca; aleta caudal rosada con la parte distal de los lóbulos color blanco, resto de las aletas de color rosado.

- Chopa/Choupa (*Spondyliosoma cantharus*) Cuerpo alto y ovalado con una ligera depresión en su perfil superior, por encima del ojo; de 15 a 18 líneas longitudinales parduzcas o doradas más o menos sinuosas, frecuentemente interrumpidas, no continuas.

Bibliografía

Báez, C., Rodríguez-Cabello, C., Bañón, R., Brito, A., Falcón, J.M., Maño, T., Baro, J., Macías, D., Meléndez, M.J., Camiñas, J.A., Arias-García, A., Gil, J., Farias, C., Artetxe, I., Sánchez, F. (2019) Updating the national checklist of marine fishes in Spanish waters: An approach to priority hotspots and lessons for conservation. *Mediterranean Marine Science*, 20/2, 260-270.

Bañón, R., Villegas-Ríos, D., Serrano, A., Mucientes, G., Arronte, J.C. (2010) Marine fishes from Galicia (NW Spain): an updated checklist. *Zootaxa*, 2667 (1): 1-27.

Bañón, R., Maño, T. 2021. Revisión taxonómica de la ictiología marina de Galicia: Clase Actinopteri (Orden Trachiniformes al Orden Tetraodontiformes). *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 28: 77-104.